

أسيون

أسيون عامة في مجموعة من الأدوية تسمى مثبطات ACE. ويستخدم لعلاج ارتفاع ضغط الدم (ارتفاع ضغط الدم) ومنع النوبات القلبية في الأشخاص المصابين بمرض الشريان التاجي.

ACN 8

قد تختلف الأسعار قليلاً عند الدفع.

اشتري الآن \$64.99	aceon 2mg * 30
اشتري الآن \$124.99	aceon 2mg * 60
اشتري الآن \$184.99	aceon 2mg * 90
اشتري الآن \$239	aceon 2mg * 120
اشتري الآن \$334	aceon 2mg * 180
اشتري الآن \$620	aceon 2mg * 360
اشتري الآن \$119.99	aceon 4mg * 30
اشتري الآن \$234.95	aceon 4mg * 60
اشتري الآن \$348.99	aceon 4mg * 90
اشتري الآن \$399	aceon 4mg * 120
اشتري الآن \$532	aceon 4mg * 180
اشتري الآن \$129.95	aceon 8mg * 30
اشتري الآن \$239.95	aceon 8mg * 60
اشتري الآن \$349.95	aceon 8mg * 90
اشتري الآن \$429.95	aceon 8mg * 120
اشتري الآن \$549.95	aceon 8mg * 180

وصف

بيري ندوبريل الكمبيوتر اللوحي

ما هو هذا الدواء؟

بيري ندوبريل مثبطات ACE. يستخدم هذا الدواء لعلاج ارتفاع ضغط الدم. كما يستخدم هذا الدواء في المرضى الذين يعانون من مرض الشريان التاجي. قد يقلل من خطر النوبات القلبية في هؤلاء المرضى.

ماذا يجب أن أقول بلدي مزود الرعاية الصحية قبل أن هذا الدواء؟

أنهم بحاجة إلى معرفة إذا كان لديك أي من هذه الشروط:

- أمراض نخاع العظام
- أمراض القلب أو الأوعية الدموية
- إذا كنت على نظام غذائي خاص، مثل اتباع نظام غذائي منخفض الملح
- أمراض الجهاز المناعي مثل الذئبة
- مرض الكلي أو الكبد
- انخفاض ضغط الدم
- السابفة تورم اللسان أو الوجه، أو الشفتين مع صعوبة في التنفس، وصعوبة البلع، بحة، أو تشديد الحنجرة
- فعل غير عادي أو حساسية بيري ندوبريل الأخرى الأس مثبطات، السم الحشرات، والأطعمة، والأصباغ أو المواد الحافظة
- حامل أو تحاول الحصول على الحوامل
- الرضاعة الطبيعية

كيف يجب استخدام هذا الدواء؟

تناول هذا الدواء عن طريق الفم مع كوب من الماء. تناول الجرعات الخاصة بك على فترات منتظمة. لا تأخذ الدواء أكثر مما يوجه. لا تتوقف عن أخذ هذا الدواء إلا بناء على نصيحة الطبيب أو الرعاية الصحية المهنية.

الجرعة الزائدة: إذا كنت تعتقد أن كنت قد اتخذت الكثير من هذا الدواء اتصل مركز مراقبة السموم أو غرفة الطوارئ في وقت واحد.

ملاحظة: هذا الدواء لك فقط. عدم مشاركة هذا الدواء مع الآخرين.

ماذا لو افترقت جرعة؟

إذا كنت افترقت جرعة، اعتبر بأسرع ما يمكنك. تأخذ إذا تقريربا وقت للجرعة القادمة، إلا أن جرعة. لا تأخذ جرعة مزدوجة أو إضافي.

ما قد تتفاعل مع هذا الدواء؟

- مدرات البول
- الجنتاميسين
- بطارية ليثيوم
- أدوية لارتفاع ضغط الدم
- المسكنات، وأدوية للألم والتهابات، مثل آيبوبروفين أو نابروكسين
- مكملات البوتاسيوم أو أملاح البوتاسيوم

هذه القائمة قد لا تصف كل التفاعلات الممكنة. إعطاء مزود الرعاية الصحية قائمة بجميع الأدوية، والأعشاب، والعقاقير غير وصفه طبية، أو المكملات الغذائية التي يمكنك استخدامها. كما أقول لهم إذا كنت تدخن، وشرب الكحول، أو تعاطي المخدرات غير المشروعة. بعض الأعراض قد تتفاعل مع الأدوية الخاصة بك.

ما ينبغي أن أشاهد لإثبات استخدام هذا الدواء؟

قم بزيارة طبيبك أو الرعاية الصحية المهنية لعمليات تفتيش منتظمة عن التقدم المحرز الخاص بك. فحص ضغط الدم وفقا لتوجيهات. اسأل طبيبك أو الرعاية الصحية المهنية ينبغي أن يكون ما هو ضغط الدم، وعندما يجب عليك الاتصال له أو لها. استدعاء الطبيب أو الرعاية الصحية المهنية إذا لاحظت قلب غير منتظمة أو سريرة للفور.

ينبغي إعلام النساء الطبيبات إذا كانت ترغب في أن تصبح حاملًا أو أعترقد أنها قد تكون حاملًا. وهناك إمكانية لآثار جانبية خطيرة للحنين. التحدث مع أخصائيي الرعاية الصحية أو الصيدلي للحصول على مزيد من المعلومات.

تحقق مع طبيبك أو الرعاية الصحية المهنية إذا كنت تحصل على هجوم من الإسهال الحاد والغثيان والقيء، أو إذا كنت العرق الكثير. فقدان الكثير من السوائل الجسم يمكن أن تجعل من خطيرة بالنسبة لك أن تأخذ هذا الدواء.

قد تحصل على النعاس أو الدوار. محرك الأقراص، واستخدام الآلات، أو فعل أي شيء يحتاج اليقظة العقلية حتى تعرف كيف يؤثر هذا الدواء لك. لا الوقوف أو الجلوس بسرعة، خاصة إذا كنت مريض كبار السن. وهذا يقلل من خطر نوبات الدوار أو الإغماء. الكحول يمكن أن تجعلك أكثر النعاس والدوار. تجنب المشروبات الكحولية.

تجنب بدائل الملح إلا إذا كنت وقال خلاف ذلك الطبيب أو الرعاية الصحية المهنية.

لا تعامل نفسك للسهال، ونزلات البرد، أو ألم في حين كنت تأخذ هذا الدواء دون أن تسأل طبيبك أو الرعاية الصحية المهنية للحصول على المشورة. بعض المكونات قد يزيد ضغط الدم

ما هي الآثار الجانبية التي قد تلاحظ من هذا الدواء؟

الآثار الجانبية التي يجب عليك إبلاغ إلى طبيبك أو الرعاية الصحية المهنية أسرع:

- الحساسية مثل الطفح الجلدي أو خلايا النحل، وتورم في اليدين والقدمين، الوجه، الشفاه، الحلق أو اللسان
- ألم في الصدر
- انخفاص كمية البول التي تم تمريرها
- صعوبة في التنفس أو صعوبة في البلع
- الدوخة، والصلابة الخفية أو نوبات إغماء
- حمى أو قشعريرة
- خدر أو وخز في الأصابع أو أصابع
- الغثيان والقيء
- المعدة أو الأم في البطن
- تورم الساقين أو الكاحلين

الآثار الجانبية عادة لا تتطلب عناية طبية (تقرير للطبيب أو الرعاية الصحية المهنية إذا كانت مواصلة أو مزعج):

- السعال
- انخفاص الوظيفية الجنسية أو الرغبة
- الإسهال
- صداع

هذه القائمة قد لا تصف جميع الآثار الجانبية المحتملة.

حيث ينبغي أن تبقى دوائي؟

تبقى بعيداً عن متناول الأطفال.

تخزين في درجة حرارة الغرفة بين 20 و 25 درجة ج (68 و 77 درجة و). حماية من الرطوبة. تخلص من أي دواء غير مستخدمة بعد تاريخ انتهاء الصلاحية

الكلمات

شراء 60 * 8mg aceon في السعودية جزيره العرب, شراء 2 mg Aceon في جزيره العرب السعودية, شراء Aceon الإمارات العربية المتحدة, أمر Aceon الإنترنت في المملكة العربية السعودية, شراء 4 mg Aceon في جزيره العرب السعودية, شراء 30 * 2mg aceon في السعودية جزيره العرب, شراء Aceon الرياض, رخصة Aceon على الإنترنت السعودية جزيره العرب, Aceon الإمارات العربية المتحدة أون لاين, Aceon تسليم سريع, Aceon الصيديات على الإنترنت, شراء Aceon الفجيرة, عام Aceon على الإنترنت, شراء Aceon 8 mg في جزيره العرب السعودية, شراء Aceon الإنترنت في الإمارات العربية المتحدة, Aceon البدائل, شراء Aceon ليلة وضحاها, Aceon أقراص الإنترنت الإمارات العربية المتحدة, شراء Aceon الشارقة, شراء Aceon على الإنترنت ماستر كارد, شراء Aceon جدة, Aceon حبوب منع الحمل, الرخصة Aceon الإمارات العربية المتحدة أون لاين, شراء Aceon الطائف, شراء Aceon السعودية, شراء Aceon إمارة دبي, شراء Aceon على الإنترنت بدون وصفة طبية, شراء Aceon مكة, Aceon للبيع,