

# أكتيغال



أكتيغال عام يستخدم لعلاج ومنع حصى في المرارة.

قد تختلف الأسعار قليلاً عند الدفع.

اشترى الآن	\$72	actigall 150mg * 30
اشترى الآن	\$132	actigall 150mg * 60
اشترى الآن	\$177	actigall 150mg * 90
اشترى الآن	\$222	actigall 150mg * 120
اشترى الآن	\$312	actigall 150mg * 180
اشترى الآن	\$581	actigall 150mg * 360
اشترى الآن	\$126.6	actigall 300mg * 30
اشترى الآن	\$211.2	actigall 300mg * 60
اشترى الآن	\$295.8	actigall 300mg * 90
اشترى الآن	\$380.4	actigall 300mg * 120
اشترى الآن	\$549.5	actigall 300mg * 180

وصف

## أورسوديول الكمبيوتر اللوحى

ما هي حبوب أورسوديول؟

أورسوديول حمض الصفراء. الدواء يساعد على حل حصى في المرارة في أولئك الذين لا يمكن أن يكون جراحة المرارة أو الذين لا تحتاج إلى عملية جراحية. يمكنك استخدام أورسوديول مع جهاز إجرائية وشظايا الحصوة إلى أجزاء أصغر؛ يسمح الإجراء، تفتيت، ودعا المخدرات لإذابة الحجارة بسرعة أكبر. أورسوديول أيضا مفيدة لبعض أمراض الكبد من البالغين والأطفال والرضع؛ المخدرات يقلل من أعراض حكة وغيره.

ماذا ينبغي أن أعرف بلدي الرعاية الصحية المهنية قبل أن أورسوديول؟

أنهم بحاجة إلى معرفة إذا كان لديك أي من هذه الشروط:

- التهاب البنكرياس (التهاب البنكرياس)
- فعل غير عادي أو حساسية على ursodiol، الأحماض الصفراوية، الأدوية، والأطعمة، والأصباغ أو المواد الحافظة
- حامل أو تحاول الحصول على الحوامل
- الرضاعة الطبيعية

كيف ينبغي أن تأخذ هذا الدواء؟

تأخذ أورسوديول كبسولات أو أقراص عن طريق الفم. اتبع التوجيهات الموجودة على الملصق وصفه طبية. تأخذ الكبسولات مع الطعام أو الحلبي لتحسين الاستيعاب والحد من المعدة أو الأمعاء آثار جانبية. تناول الجرعات الخاصة بك على فترات منتظمة. لا تأخذ الدواء أكثر مما يوجه.

اتصل بطبيب أطفال أو أخصائي الرعاية الصحية فيما يتعلق باستخدام هذا الدواء في الأطفال. قد تكون هناك حاجة الرعاية الخاصة. عادة، يجب إعداد صيدلي هذا الدواء إلى تعليق للإدارة للأطفال.

الجرعة الزائدة: إذا كنت تعتقد أن كنت قد اتخذت الكثير من هذا الدواء اتصل مركز مراقبة السموم أو غرفة الطوارئ في وقت واحد.

ملاحظة: هذا الدواء لك فقط. عدم مشاركة هذا الدواء مع الآخرين.

## ماذا لو افقدت جرعة؟

إذا كنت افقدت جرعة، اعتبر بأسرع ما يمكنك. تأخذ إذا تقريرها وقت للجرعة القادمة، إلا أن جرعة. لا تأخذ جرعة مزدوجة أو إضافي.

## ما قد تتفاعل مع أورسوديول؟

- الفحم المنشط
- مضادات الحموضة
- كوليستيرامين
- كلوفايبرات أو فينوفايبرات حم فينوبروزيل
- السيبروفلوكساسين
- كوليستيرامين
- كوليستيبول
- ديكستروثيروكسين
- الهرمونات الأنثوية، بما في ذلك هرمون الإستروجين أو حبوب

أقول أخصائي الرعاية الصحية أو بريسكريري عن جميع الأدوية الأخرى التي تتناولها، بما في ذلك الأدوية غير وصفه طبية، أو المكملات الغذائية، أو منتجات الأعشاب. أقول أيضا بريسكريري أو الرعاية الصحية المهنية الخاصة بك إذا كنت مستخدم متكررة من المشروبات مع الكافيين أو الكحول، إذا كنت من الدخان، أو إذا كنت تستخدم المخدرات غير المشروعة. وهذه قد تؤثر على الطريقة التي تعمل بها الأدوية الخاصة بك. تحقق مع الرعاية الصحية المهنية قبل إيقاف أو بدء تشغيل أي من الأدوية الخاصة بك.

## ما ينبغي أن أشاهد لحين أخذ ursodiol؟

زيارة الخاص بك بريسكريري أو الرعاية الصحية المهنية لعمليات تفتيش من منظمة عن التقدم المحرز الخاص بك. قد يستغرق شهرًا لعلاج للحصول على الاستجابة الصحية. بريسكريري أو الرعاية الصحية المهنية الخاصة بك سيتم جدولة الاختبارات لمعرفة إذا كان يتم تذويب حصي في المرارة الخاص بك أو إذا كان لديك مشكلة الكبد هو تحسني. تقرير استمرار أو تفاقم الغثيان أو القيء أو الألم في البطن إلى بريسكريري الخاص بك.

الاستمرار في تناول الدواء حتى لو كنت تشعر أفضل، إلا إذا كان خلاف ذلك من إخراج الخاص بك بريسكريري أو الرعاية الصحية المهنية. لا تتوقف عن أخذ ما عدا على المشورة الخاصة بك بريسكريري.

مضادات الحموضة قد تتداخل مع امتصاص أورسوديول. أن أورسوديول على الأقل 1 ساعة قبل أو ساعتين بعد جرعة حموضة.

## ما هي الآثار الجانبية التي قد تلاحظ من أخذ أورسوديول؟

الآثار الجانبية التي يجب عليك إبلاغ prescriber أو الرعاية الصحية المهنية أسرع:

- أي علامات للحساسية (نادرة): الجلد صعوبة في التنفس، وخلايا النحل، حكة الطفح الجلدي أو غير عادية
- الأم في المعدة شديدة المنطقة، لا سيما تجاه الجانب الأيسر الخاص بك

الآثار الجانبية التي عادة لا تتطلب العناية الطبية (التقرير الخاص بك بريسكريري أو الرعاية الصحية المهنية إذا كانت مواصلة أو مزعج):

- السعال أو التهاب في الحلق
- الإسهال
- تساقط الشعر أو رقيق
- صداع
- أوجاع المفاصل أو العضلات
- الإمساك

- الغاز
- عسر الهضم
- الغثيان

هذه القوائم قد لا تصف جميع الآثار الجانبية المحتملة.

## حيث يمكنك أن تبقى دوائي؟

تبقى بعيداً عن متناول الأطفال في حاوية أن الأطفال الصغار لا يمكن فتح.

تخزين في درجة حرارة الغرفة أدناه 30 درجة مئوية (86 درجة فهرنهايت). تبقى في حاوية مغلقة جيداً. تخلص من أي دواء غير مستخدمة بعد تاريخ انتهاء الصلاحية.

## الكلمات

Actigall للبيغ، عام Actigall على الانترنت، شراء Actigall الإنترنت في الإمارات العربية المتحدة، شراء Actigall العربية السعودية، شراء Actigall جده، شراء Actigall على الانترنت بدون وصفة طبية، شراء Actigall أم القيوين، شراء Actigall الدم، Actigall تسليم سريع، Actigall الصيديات على الإنترنت، شراء Actigall 150 mg في جزيره العرب السعودية، Actigall البدائل، شراء Actigall لجلسة وضحاها، Actigall الإمارات العربية المتحدة أون لاين، شراء Actigall الرياض، Actigall أقراص الإنترنت الإمارات العربية المتحدة، شراء Actigall عجمان، رخصة Actigall على الانترنت السعودية جزيره العرب، شراء Actigall مكة، Actigall حبوب منع الحمل، الرخصة Actigall الإمارات العربية المتحدة أون لاين، شراء Actigall الإمارات العربية المتحدة، شراء 60 \* 150mg actigall في السعودية جزيره العرب، أمر Actigall الإنترنت في المملكة العربية السعودية، شراء Actigall 300 mg في جزيره العرب السعودية، شراء Actigall على الانترنت ماستر كارد، شراء Actigall الطائف، شراء Actigall المدينة المنورة، شراء 30 \* 300mg actigall في السعودية جزيره العرب،