

# أكتوبلوس التقي

التقي أكتوبلوس عامة تستخدم لعلاج مرض السكري من النوع 2. وهو يستخدم جنباً إلى جنب مع النظام الغذائي وممارسة الرياضة. أنه يعمل عن طريق تقليل كمية السكر تنتج الكبد والأمعاء امتصاص.



قد تختلف الأسعار قليلاً عند الدفع.

اشترى الآن	\$59.95	actoplus met 500mg * 30
اشترى الآن	\$99.95	actoplus met 500mg * 60
اشترى الآن	\$134.95	actoplus met 500mg * 90
اشترى الآن	\$167.95	actoplus met 500mg * 120
اشترى الآن	\$233.95	actoplus met 500mg * 180

وصف

## الكيمبيوتر اللوحي الميتميز فورمين وبيوغليتازون ما هو هذا الدواء؟

الميتميز فورمين؛ بيوغليتازون يساعد على علاج داء السكري من النوع 2. فإنه يساعد على التحكم في نسبة السكر في الدم. يتم الجمع بين العلاج مع النظام الغذائي وممارسة الرياضة.

ماذا يجب أن أقول بلدي مزود الرعاية الصحية قبل أن هذا الدواء؟

أنهم بحاجة إلى معرفة إذا كان لديك أي من هذه الشروط:

- تصبح المحففة بسهولة
- ketoacidosis السكري
- أمراض القلب
- إذا كنت كثيرًا ما شرب الكحول التي تحتوي على المشروبات
- أمراض الكلى
- أمراض الكبد
- متلازمة تكيس المبايض
- الإصابة الخطيرة أو الإصابة
- تورم في الذراعين، والساقين، أو القدمين
- تمر بعملية جراحية أو بعض إجراءات الأشعة السينية مع عوامل التباين القابلة للحقن
- قيء
- فعل غير عادي أو حساسية على الميتميز فورمين، بيوغليتازون، والأدوية، والأطعمة، والأصباغ أو المواد الحافظة
- حامل أو تحاول الحصول على الحمل
- الرضاعة الطبيعية

## كيف يجب استخدام هذا الدواء؟

تناول هذا الدواء عن طريق الفم مع كوب من الماء. يأخذ هذا الدواء مع الغذاء. تناول الجرعات الخاصة بك على فترات منتظمة. لا تأخذ الدواء أكثر مما يوجه. لا تتوقف عن أخذ إلا بناء على مشورة الطبيب.

التحدث إلى طبيبك الأطفال الخاص بك فيما يتعلق باستخدام هذا الدواء في الأطفال. قد تكون هناك حاجة الرعاية الخاصة.

الجرعة الزائدة: إذا كنت تعتقد أن كنت قد اتخذت الكثير من هذا الدواء اتصل مركز مراقبة السموم أو غرفة الطوارئ في وقت واحد.

ملاحظة: هذا الدواء لك فقط. عدم مشاركة هذا الدواء مع الآخرين.

## ماذا لو افترقد جرعة؟

إذا كنت افترقد جرعة، اعتربر بأسرع ما يمكن. تأخذ إذا تقرربا وقت للجرعة القادمة، إلا أن جرعة. لا تأخذ جرعة مزدوجة أو إضافي.

## ما قد تتفاعل مع هذا الدواء؟

لا تأخذ هذا الدواء مع أي من الأدوية التالية:

- دوفيتي لويدي
- جاتي فلوكساسين
- على النقيض من بعض الأدوية تعطى قبل الأشعة السينية، الأشعة المقطعية، التصوير بالرنين المغناطيسي، أو غيرها من الإجراءات

كما أن هذا الدواء قد تتفاعل مع الأدوية التالية:

- اتورفاستاتين
- الديوكوسين
- مدرات البول
- الهرمونات الأنثوية، مثل الإستروجين أو البروجستينات وحبوب
- جم في بروزيل
- الأنسولين
- الإيزونيازيد
- كيتوكونازول
- فاز أدوية لضغط الدم، وأمراض القلب، والقلب
- الميديازولام
- مورفين
- النياسين
- الفينوثيازين مثل كلوربرومازين، ميسوريديازين، بروكلوربيرازين، ثيوريديازين
- الفينيتوين
- أميد
- كينيدين
- الكينيدين
- رانيتيدين
- وريفامبين
- أدوية الستيريرويد مثل بريديزون أو الكورتيزون
- هرمونات الغدة الدرقية
- ميثوبريم
- فانكومايسين

هذه القائمة قد لا تصف كل التفاعلات الممكنة. إعطاء مزود الرعاية الصحية قائمة بجميع الأدوية، والأعشاب، والعقاقير غير وصفه طبية، أو المكملات الغذائية التي يمكنك استخدامها. كما أقول لهم إذا كنت تدخن، وشرب الكحول، أو تعاطي المخدرات غير المشروعة. بعض العناصر قد تتفاعل مع الأدوية الخاصة بك.

## ما ينبغي أن أشاهد لإثناء استخدام هذا الدواء؟

قم بزيارة طبيبك أو الرعاية الصحية المهنية لعمليات تفتيش منتظمة عن التقدم المحرز الخاص بك. تعلم كيفية فحص نسبة السكر في الدم. أخبر طبيبك أو الرعاية الصحية المهنية في حالة ارتفاع نسبة السكر في الدم، فقد تحتاج إلى تغيير جرعة الدواء.

إذا كنت غير المرضية أو ممارسة أكثر من المعتاد، فقد تحتاج إلى تغيير جرعة الدواء. لا تخطي وجبات الطعام. اسأل طبيبك أو أخصائي الرعاية الصحية إذا كان عليك تجنب الكحول.

إذا كان لديك أعراض انخفاض السكر في الدم، أكل أو شرب شيء يحتوي على السكر في وقت واحد واتصل

بطببي بك أو الرعاية الصحية المهنية.

تأكد من معرفة أفراد الأسرة لك يمكنك خنق إذا أكل أو شرب عند تطویر الأعراض الخطيرة لانخفاض السكر في الدم، مثل مصادرة أو فقدان الوعي. يجب عليك الحصول على مساعدة طبية في وقت واحد. ارتداء سوار التعريف الطبي أو سلسلة يقول كنت مصاباً بداء السكري، ويحمل بطاقة يسرد جميع الأدوية الخاصة بك.

## ما هي الآثار الجانبية التي قد تلاحظ من تلقي هذا الدواء؟

الآثار الجانبية التي يجب عليك إبلاغ إلى طبيبك أو الرعاية الصحية المهنية أسرع:

- الحساسية مثل طفح جلدي، حكة أو خلايا النحل، وتورم الوجه، الشفاه، أو اللسان
- مشاكل في التنفس
- البول الداكن
- الدوخة
- الشعور بالسقوط باهتة أو دوام،
- حمى، قشعريرة، والتهاب في الحلق
- انخفاض السكر في الدم (اسأل طبيبك أو الرعاية الصحية المهنية للحصول على قائمة من هذه الأعراض)
- الأم في العضلات، الأم
- بطن أو عدم انتظام ضربات القلب
- الأم في المعدة
- تورم الأيدي أو الأرجل، أو أقدام
- متعب أو ضعيفة على نحو غير عادي
- اصفرار الجلد أو العيني

الآثار الجانبية عادة لا تتطلب عناية طبية (تقرير للطبيب أو الرعاية الصحية المهنية إذا كانت مواصلة أو مزعج):

- الإسهال
- صداع
- الغاز المعدة، حرقة
- الغثيان
- مشاكل مع الأسنان

هذه القائمة قد لا تصف جميع الآثار الجانبية المحتملة.

## حيث ينبغي أن تبقى دوائى؟

تبقى بعيداً عن متناول الأطفال.

تخزين في درجة حرارة الغرفة بين 15 و 30 درجة ج (59 و 86 درجة F). حماية من الرطوبة والضوء. تخلص من أي دواء غير مستخدمة بعد تاريخ انتهاء الصلاحية.

## الكلمات

ActoPlus Met الصيدليات على الإنترنت، شراء ActoPlus Met على الإنترنت بدون وصفة طبية، شراء ActoPlus Met الرياضي، ActoPlus Met الإمارات العربية المتحدة أون لاين، ActoPlus Met أقراص الإنترنت الإمارات العربية المتحدة، ActoPlus Met تسليم سريع، شراء ActoPlus Met الإنترنت في الإمارات العربية المتحدة، ActoPlus Met للبيع، شراء ActoPlus Met 500 mg في جزيره العرب السعودية، ActoPlus Met البدائل، الرخيصة ActoPlus Met الإمارات العربية المتحدة أون لاين، شراء ActoPlus Met رأس الخيمة، شراء ActoPlus Met عجمان، شراء ActoPlus Met إمارة دبي، ActoPlus Met، حبوب منع الحمل، شراء ActoPlus Met الهفوف، شراء ActoPlus Met على الإنترنت ماستر كارد، شراء ActoPlus Met جدة، شراء ActoPlus Met ليلية وضحاها، عام ActoPlus Met على الإنترنت، شراء ActoPlus Met 500mg \* 60 في السعودية جزيره العرب، شراء ActoPlus Met الإمارات العربية المتحدة، شراء ActoPlus Met 500mg \* 120 في السعودية جزيره العرب، شراء

ActoPlus Met العربية السعودية، أمر ActoPlus Met الإنترنت في المملكة العربية السعودية، رخصة  
ActoPlus Met على الإنترنت السعودية جزيره العرب، شراء ActoPlus Met الدم،