

صحيفة Cialis



عام Cialis يوميًا يستخدم لعلاج ضعف الانتصاب (ED). أنسب للرجال مع اد الذي توقع النشاط الجنسي أكثر تواترًا.

قد تختلف الأسعار قليلاً عند الدفع.

اشترى الآن	\$39.95	cialis daily 5mg * 10
اشترى الآن	\$59.95	cialis daily 5mg * 20
اشترى الآن	\$89.95	cialis daily 5mg * 30
اشترى الآن	\$149.95	cialis daily 5mg * 60
اشترى الآن	\$199.95	cialis daily 5mg * 90
اشترى الآن	\$239.95	cialis daily 5mg * 120
اشترى الآن	\$299.95	cialis daily 5mg * 180
اشترى الآن	\$379.95	cialis daily 5mg * 270
اشترى الآن	\$395.95	cialis daily 5mg * 360

وصف

كوالىومي الكمبيوتر اللوحي

ما هو هذا الدواء؟

لجرعات منخفضة من كوالىومي مؤخرًا موافقة إدارة الأغذية والعقاقير للاستخدام اليومي لعلاج مشاكل الانتصاب لدى الرجال.

ماذا يجب أن أقول بلدي مزود الرعاية الصحية قبل أن هذا الدواء؟

أنهم بحاجة إلى معرفة إذا كان لديك أي من هذه الشروط:

- مشاكل في العين أو الرؤية، بما في ذلك نادر ورثت أمراض العين يسمى التهاب الشبكية الصبغية
- أمراض القلب، والذبحة الصدرية، تاريخ من أزمة قلبية أو دقات القلب غير المنتظمة أو مشاكل القلب الأخرى
- ارتفاع أو انخفاض ضغط الدم
- مرض الكلى أو الكبد
- السكتة الدماغية
- فعل غير عادي أو حساسية على كوالىومي أو الأدوية الأخرى، والأطعمة، والأصباغ أو المواد الحافظة

كيف يجب استخدام هذا الدواء؟

يأخذ هذا الدواء كل يوم دون اعتبار توقيت النشاط الجنسي الخاص بك. اعتبر عن طريق الفم مع كوب من الماء. يمكنك أن تأخذ هذا الدواء مع أو بدون وجبات الطعام. لا يجب أن تأخذ الجرعة الخاصة بك أكثر من مرة في اليوم الواحد.

الجرعة الزائدة: إذا كنت تعتقد أن كنت قد اتخذت الكثير من هذا الدواء اتصل مركز مراقبة السموم أو غرفة الطوارئ في وقت واحد.

ملاحظة: هذا الدواء لك فقط. عدم مشاركة هذا الدواء مع الآخرين.

ماذا لو افترقت جرعة؟

إذا كنت افترقت جرعة، قد اعتبر عن تذكر ولكن لا تأخذ جرعة واحدة أو أكثر في اليوم الواحد. لا تأخذ جرعة مزدوجة أو إضافي.

ما قد تتفاعل مع هذا الدواء؟

لا تأخذ هذا الدواء مع أي من الأدوية التالية:

- النترات مثل نترات الأميل، isosorbide dinitrate، مونونترات إي سوسوربيدي، نيتروغليسيرين
- كما أن هذا الدواء قد تتفاعل مع الأدوية التالية:
- بعض الأدوية لارتفاع ضغط الدم
- بعض الأدوية لعلاج الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية أو الإيدز
- بعض الأدوية المستخدمة للفطريات أو الخميرة العدوى، مثل الايتراكونازول، الكيتوكونازول، الفلوكونازول وفوريكونازولي
- بعض الأدوية المستخدمة للمضبوطات مثل كاربامازيبين، فينيبتوين، وفينبوباربيتال
- عصير الليمون الحلو
- مكاروليد المضادات الحيوية مثل كلاريتروميسين، الاريتروميسين، تروليندوميسين
- أدوية لمشاكل البروستات
- ريفابوتين أو ريفمبين أو ريفابنتين

هذه القائمة قد لا تصف كل التفاعلات الممكنة. إعطاء مزود الرعاية الصحية قائمة بجميع الأدوية، والأعشاب، والعقاقير غير وصفه طبية، أو المكملات الغذائية التي يمكنك استخدامها. كما أقول لهم إذا كنت تدخن، وشرب الكحول، أو تعاطي المخدرات غير المشروعة. بعض العناصر قد تتفاعل مع الأدوية الخاصة بك.

ما ينبغي أن أشاهد لإثبات استخدام هذا الدواء؟

إذا لاحظت أي تغييرات في الرؤية الخاصة بك في حين أخذ هذا الدواء، استدعاء الطبيب أو الرعاية الصحية المهمة أسرع. التوقف عن استخدام هذا الدواء واتصل بموفر الرعاية الصحية فوراً إذا كان لديك فقدان البصر في إحدى أو كلتا العينين.

اتصل لك الطبيب أو الرعاية الصحية المهمة الحق بعدياً إذا استمر الانصباب أكثر من 4 ساعات أو إذا فإنها تصبح مؤلمة. وهذا قد يكون علامة على مشكلة خطيرة ويجب أن تعامل على الفور لمنع ضرر دائم.

إذا كنت تعاني من أعراض الغثيان، الدوخة، ألم في الصدر أو ألم الذراع عند بدء النشاط الجنسي بعد أخذ هذا الدواء، ينبغي الامتناع عن المزيد من النشاط واستدعاء الطبيب أو الرعاية الصحية المهمة أسرع.

لا تشرب الكحول الزائدة (أمثلة، 5 أكواب من النبيذ أو 5 طلقات من الويسكي) عند أخذ هذا الدواء. عند تناول في الكحول الزائد، يمكنك زيادة فرصك في الحصول على صداع أو الحصول على الدوار، وزيادة معدل ضربات القلب أو انخفاض ضغط الدم.

استخدام هذا الدواء لا تحمي أنت أو شريكك ضد الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية (الفيروس الذي يسبب مرض الإيدز) أو غيره من الأمراض المنقولة جنسياً.

ما هي الآثار الجانبية التي قد تلاحظ من هذا الدواء؟

الآثار الجانبية التي يجب عليك إبلاغ إلى طبيبك أو الرعاية الصحية المهمة أسرع:

- الحساسية مثل طفح جلدي، حكة أو خلايا النحل، وتورم الوجه، الشفاه، أو اللسان
- مشاكل في التنفس
- التغيرات في السمع
- ألم في الصدر
- سريرة، وعدم انتظام ضربات القلب

الآثار الجانبية عادة لا تتطلب عناية طبية (تقرير للطبيب أو الرعاية الصحية المهمة إذا كانت مواصلة أو مزعج):

- الأم الظهر
- الدوخة
- بيغ

- صداع
- عسر الهضم
- الألم في العضلات
- انسداد أو سيلان الأنف

هذه القائمة قد لا تصف جميع الآثار الجانبية المحتملة.

حيث ينبغي أن تبقى دوائى؟

تبقى بعيداً عن متناول الأطفال.

تخزين في درجة حرارة الغرفة بين 15 و 30 درجة ج (59 و 86 درجة F). تخلص من أي دواء غير مستخدمة بعد تاريخ انتهاء الصلاحية.

الكلمات

شراء Cialis Daily رأس الخيمة, شراء Cialis Daily الإنترنت في الإمارات العربية المتحدة, Cialis Daily تسليم سريري, Cialis Daily أقراص الإنترنت الإمارات العربية المتحدة, شراء Cialis Daily العربية السعيدية, شراء Cialis Daily الرياض, شراء Cialis Daily مكة, شراء Cialis Daily عجمان, Cialis Daily حبوب منع الحمل, عام Cialis Daily على الإنترنت, شراء Cialis Daily المدينة المنورة, شراء Cialis Daily أم القيوين, Cialis Daily الصيديات على الإنترنت, شراء Cialis Daily 5 mg في جزيره العرب السعيدية, شراء Cialis Daily على الإنترنت بدون وصفة طبية, شراء Cialis Daily الإمارات العربية المتحدة, رخصة Cialis Daily على الإنترنت السعيدية جزيره العرب, شراء Cialis Daily الطائف, شراء Cialis Daily جدة, Cialis Daily للبيوع, شراء Cialis Daily على الإنترنت ماستر كارد, الرخصة Cialis Daily الإمارات العربية المتحدة أون لاي, شراء Cialis Daily 5mg * 180 في السعيدية جزيره العرب, شراء Cialis Daily ليلة وضحاها, شراء Cialis Daily 360 * 5mg في السعيدية جزيره العرب, Cialis Daily البدائل, Cialis Daily الإمارات العربية المتحدة أون لاي, أمر Cialis Daily الإنترنت في المملكة العربية السعيدية,