

بريكس

بريكس عامة تستخدم لعلاج مرض السكري من النوع 2 في البالغين
السكري الذين لا يمكن أن تدار مع النظام الغذائي وحده. ويمكن استخدام
هذا الدواء وحده، بالاقتران مع غيرها أدوية السكري عن طريق الفم أو مع
الأنسولين.



قد تختلف الأسعار قليلاً عند الدفع.

اشترى الآن	\$67.2	precose 25mg * 30
اشترى الآن	\$92.4	precose 25mg * 60
اشترى الآن	\$117.6	precose 25mg * 90
اشترى الآن	\$142.8	precose 25mg * 120
اشترى الآن	\$193.2	precose 25mg * 180
اشترى الآن	\$344.4	precose 25mg * 360
اشترى الآن	\$87	precose 50mg * 30
اشترى الآن	\$132	precose 50mg * 60
اشترى الآن	\$177	precose 50mg * 90
اشترى الآن	\$222	precose 50mg * 120
اشترى الآن	\$312	precose 50mg * 180

وصف

أيكاربوس الكمبيوتر اللوحى

ما هو هذا الدواء؟

أيكاربوس يساعد على علاج داء السكري من النوع 2. فإنه يساعد على التحكم في نسبة السكر في الدم. يتم الجمع بين العلاج مع النظام الغذائي وممارسة الرياضة.

ماذا ينبغي أن أعرف بلدي الرعاية الصحية المهنية قبل التقاط هذا الدواء؟

أنهم بحاجة إلى معرفة إذا كان لديك أي من هذه الشروط:

- ketoacidosis
- أمراض الكلى
- أمراض الكبد
- أمراض المعدة أو الأمعاء، أو عرقلة
- فعل غير عادي أو حساسية أيكاربوس أو الأدوية الأخرى، والأطعمة، والأصباغ أو المواد الحافظة
- حامل أو تحاول الحصول على الحوامل
- الرضاعة الطبيعية

كيف ينبغي أن تأخذ هذا الدواء؟

تناول هذا الدواء عن طريق الفم مع كوب من الماء. ابتلاع الحبوب في بداية الوجبة الرئيسية. تناول الجرعات الخاصة بك على فترات منتظمة. لا تأخذ الدواء أكثر مما يوجه. لا تتوقف عن أخذ هذا الدواء إلا بناء على نصيحة الطبيب أو الرعاية الصحية المهنية.

إذا قمت بتطوير القيء الشديد أو الإسهال الشديد الذي يمنعك من وجبات الأكل، استدعاء الطبيب أو الرعاية الصحية المهنية للحصول على المشورة.

التحدث إلى طبيب الأطفال الخاص بك فيما يتعلق باستخدام هذا الدواء في الأطفال. قد تكون هناك حاجة الرعاية الخاصة.

الجرعة الزائدة: إذا كنت تعتقد أن كنت قد اتخذت الكثير من هذا الدواء اتصل مركز مراقبة السموم أو غرفة الطوارئ في وقت واحد.

ملاحظة: هذا الدواء لك فقط. عدم مشاركة هذا الدواء مع الآخرين.

ماذا لو افترقت جرعة؟

إذا كنت قد نسيت الجرعة الخاصة بك في بداية وجبة الخاص بك وكننت لا تزال أكل هذه الوجبة، تأخذ الجرعة الخاصة بك بين ما كنت لا تزال الأكل. وبخلاف ذلك، تخطي الجرعة الفائتة. هذا الدواء غير فعال إذا لم تتخذ أثناء وجبة. الانتظار للجرعة القادمة في وجبتك الرئيسية القادمة، وتأخذ فقط أن جرعة. لا تأخذ جرعة مزدوجة أو إضافية.

ما قد تتفاعل مع هذا الدواء؟

- الفحم النباتي
- الإنزيمات الهضمية مثل الأميليز وبنكرياتين
- الديقوكسين
- مدرات البول
- الهرمونات الأنثوية، مثل الإستروجين أو البروجستينات وحبوب
- الإيزونيازيد
- أدوية علاج نزلات البرد أو صعوبات في التنفس مثل الافيديرين أو phenylephrine
- أدوية لارتفاع ضغط الدم تسمى حاصرات بيتا ومحصرات قنوات الكالسيوم
- حمض النيكوتينيك
- الفينوثيازين مثل كلوربرومازين، ميسوريديازين، بروكلوربيرازين، ثيوريديازين
- الفينيتوين
- أدوية الستيريرويد مثل بريدنيزون أو الكورتيزون
- هرمونات الغدة الدرقية

أقول أخصائي الرعاية الصحية أو بريسكريبيري عن جميع الأدوية الأخرى التي تتخذونها، بما في ذلك الأدوية غير وصفه طبية، أو المكملات الغذائية، أو منتجات الأعشاب. أقول أيضا بريسكريبيري أو الرعاية الصحية المهنية الخاصة بك إذا كنت تستخدم متكررة من المشروبات مع الكافيين أو الكحول، إذا كنت من الدخان، أو إذا كنت تستخدم المخدرات غير المشروعة. وهذه قد تؤثر على الطريقة التي تعمل بها الأدوية الخاصة بك. تحقق مع الرعاية الصحية المهنية قبل إيقاف أو بدء تشغيل أي من الأدوية الخاصة بك.

ما ينبغي أن أشاهد لحين أخذ هذا الدواء؟

قم بزيارة طبيبك أو الرعاية الصحية المهنية لفحوص منتظمة. تعلم كيفية فحص نسبة السكر في الدم. الحفاظ على خطة النظام الغذائي والتمارين الخاصة بك بين ما كنت أخذ هذا الدواء.

تعرف علامات انخفاض السكر في الدم، وعلهم للناس من حولك. في حالة انخفاض السكر في الدم، تبقى مصدرا للسكر معك.

من المهم اتباع حمية السكر عند أخذ هذا الدواء. وهذا قد يساعد إنقاص بعض الآثار الجانبية مثل الإسهال، والنفخ، والغاز. إذا كنت تتبع النظام الغذائي ولا يزال لديك إسهال شديد أو الغاز، اتصل بأخصائي الرعاية الصحية.

ارتداء سوار التعريف الطبي أو سلسلة يقول كنت مصاباً بداء السكر، ويحمل بطاقة ي سرد جميع الأدوية الخاصة بك.

ما هي الآثار الجانبية التي قد تلاحظ من هذا الدواء؟

الآثار الجانبية التي يجب عليك إبلاغ إلى طبيبك أو الرعاية الصحية المهنية أسرع:

- الحساسية مثل طفح جلدي، حكة أو خلايا النحل، وتورم الوجه، الشفاه، أو اللسان
- البول الداكن
- فقدان الشهية
- متعب أو ضعيفة على نحو غير عادي
- فقدان الوزن

• اصفرار الجلد أو العيونين

الآثار الجانبية عادة لا تتطلب عناية طبية (تقرير للطبيب أو الرعاية الصحية المهنية إذا كانت مواصلة أو مزعج):

- الشعور المتضخمة
- الإسهال
- الغاز المعدة، الهادر
- الأم في المعدة، اضطراب

هذه القائمة قد لا تصف جميع الآثار الجانبية المحتملة.

حيث يمكنك أن تبقى دوائي؟

تبقى بعيداً عن متناول الأطفال.

تخزين في درجة حرارة الغرفة أدناه 25 درجة مئوية (77 درجة فهرنهايت). حماية من الرطوبة. الاحتفاظ بحاوية مغلقة بأحكام. تخلص من أي دواء غير مستخدمة بعد تاريخ انتهاء الصلاحية.

الكلمات

شراء Precose الإنترنت في الإمارات العربية المتحدة, Precose أقراص الإنترنت الإمارات العربية المتحدة, شراء Precose 25mg * 30 في السعودية جزيره العرب, Precose حبوب منع الحمل, شراء Precose الفجيرة, أمر Precose الإنترنت في المملكة العربية السعودية, Precose البدائل, شراء Precose 25 mg في جزيره العرب السعودية, Precose الإمارات العربية المتحدة أون لاين, شراء Precose العربية السعودية, Precose الصيدليات على الإنترنت, شراء Precose أم القيوين, شراء Precose الرياض, شراء Precose ليلية وضحاها, رخصة Precose على الإنترنت السعودية جزيره العرب, شراء Precose للبيعه, شراء Precose 50mg * 180 في السعودية جزيره العرب, شراء Precose على الإنترنت بدون وصفة طبية, شراء Precose 50 mg في جزيره العرب السعودية, شراء Precose جدة, شراء Precose على الإنترنت ماستر كارد, الرخصة الإمارات العربية المتحدة أون لاين, شراء Precose المدينة المنورة, Precose تسليم سرعي, عام Precose على الإنترنت, شراء Precose الإمارات العربية المتحدة, شراء Precose رأس الخيمة,