

# زيلوبريم

زيلوبريم عامة يستخدم في علاج كثير من أعراض النقرس، بما في ذلك الهجمات الحادة، التوفه (جمع بلورات حمض البوليك في الأنسجة، خاصة حول المفاصل) وتدمير مشتركة والحجارة حمض اليوريك. الوبوريينول يعمل عن طريق الحد من إنتاج حمض اليوريك في الجسم، وبالتالي يمنع بلورات من تشكيل.



قد تختلف الأسعار قليلا عند الدفع.

اشتري الآن	\$20.99	zyloprim 100mg * 30
اشتري الآن	\$38.99	zyloprim 100mg * 60
اشتري الآن	\$53.99	zyloprim 100mg * 90
اشتري الآن	\$77.99	zyloprim 100mg * 120
اشتري الآن	\$107.99	zyloprim 100mg * 180
اشتري الآن	\$199.99	zyloprim 100mg * 360
اشتري الآن	\$29.99	zyloprim 300mg * 30
اشتري الآن	\$54.99	zyloprim 300mg * 60
اشتري الآن	\$74.99	zyloprim 300mg * 90
اشتري الآن	\$89.99	zyloprim 300mg * 120
اشتري الآن	\$129.99	zyloprim 300mg * 180
اشتري الآن	\$249.99	zyloprim 300mg * 360

وصف

## الوبوريينول الكمبيوتر اللوحى

ما هو هذا الدواء؟

الوبوريينول هو مانع إنزيم يخفض مستويات عالية من حمض اليوريك في الجسم بتقليل الكمية المنتجة. يتم استخدامه لعلاج مرض النقرس وأنواع معينة من حصى الكلى. كما يستخدم هذا الدواء لمنع مستويات عالية من حمض اليوريك في المرضى الذين يتلقون العلاج الكيماوي للسرطان. الخلايا السرطانية التي تدمر مع العلاج بالإفراج عن كميات كبيرة من حمض اليوريك إلى مجرى الدم.

ماذا يجب أن أقول بلدي مزود الرعاية الصحية قبل أن هذا الدواء؟

أنهم بحاجة إلى معرفة إذا كان لديك أي من هذه الشروط:

- أمراض الكبد
- أمراض الكلى
- مرض السكري
- ارتفاع ضغط الدم
- الوجبات الغذائية غير عادية (مثل حمية التجويع)
- فعل غير عادي أو حساسية الوبوريينول أو الأدوية الأخرى، والأطعمة، والأصباغ أو المواد الحافظة
- حامل أو تحاول الحصول على الحوامل
- الرضاعة الطبيعية

كيف ينبغي أن تأخذ هذا الدواء؟

يأخذ هذا الدواء عن طريق الفم عادة مرة واحدة يوميًا بعد وجبة لتقليل المعدة بالضيق، أو حسب توجيهات الطبيب. فمن الأفضل شرب كوب كامل من الماء مع كل جرعة وأخرى على الأقل 8 أكواب (8 أوقية. كل) يوميًا في حين أخذ هذا الدواء لمنع الكلى الحجارة من تشكيل. إذا كنت تعمل على تقييد كمية السائل، استشر طبيبك للحصول على مزيد من الإرشادات. الطبيب قد توجهك أيضا على كيفية تقليل الحموضة في البول (مثل تجنب كميات كبيرة من حامض الأسكوربيك أو فيتامين ج). الجرعة يستند على الحالة الصحية الخاصة بك واستجابة للعلاج. استخدم هذا الدواء بانتظام للحصول على أكبر قدر من الفائدة

من ذلك. تذكر أن اعتبر في نفس الوقت كل يوم. لعلاج النقرس، قد يستغرق عدة أسابيع لهذا الدواء ليكون لها تأثير.

## ماذا لو افقد جرعة؟

إذا كنت افقد جرعة، اعتبر حالمًا تتذكر. إذا كان في الوقت قريبا من الجرعة التالية، تخطي الجرعة الفائتة واستئنف جدول الجرعات المعتادة الخاصة بك. عدم مضاعفة الجرعة اللحاق بالركب.

## ما قد تتفاعل مع هذا الدواء؟

لا تأخذ ذلك بما يلي:

- ديدانوزين

قد تتفاعل أيضا مع:

- بعض المضادات الحيوية (أموكسيسيلين، الأمبيسلين)
- بعض الأدوية الربو (الامينوفيلين، الثيوفيلين)
- الازاثيوبرين
- "سيولة الدم" (مثل وارفارين)
- تشلوروبروباميدي
- السيكلوسبورين
- مركبات توبيريون
- وسلفينبيرازون
- "حبوب الماء" (مثلًا، المدرات الثييازيديه مثل هيدروكلوروثييازيدي)

أقول أخصائي الرعاية الصحية أو بريسيكريبير عن جميع الأدوية الأخرى التي تتناولها، بما في ذلك الأدوية غير وصفه طبية، والمكملات الغذائية، ومن منتجات الأعشاب. أقول أيضا بريسيكريبير أو الرعاية الصحية المهنيّة الخاصة بك إذا كنت تستخدم متكررة من المشروبات مع الكافيين أو الكحول، إذا كنت من الدخان، أو إذا كنت تستخدم المخدرات غير المشروعة. وهذه قد تؤثر على الطريفة التي تعمل بها الأدوية الخاصة بك. تحقق مع الرعاية الصحية المهنيّة قبل إيقاف أو بدء تشغيل أي من الأدوية الخاصة بك.

## ما ينبغي أن أشاهد لحين أخذ هذا الدواء؟

هذا الدواء قد تجعلك النعاس؛ استخدم الحذر الانخراط في الأنشطة التي تتطلب اليقظة مثل القيادة أو استخدام الآلات. الكحول قد يقلل فعالية هذا الدواء. الحد من المشروبات الكحولية. ينبغي استخدام هذا الدواء فقط عند الضرورة أثناء الحمل. من اقشدة المخاطر والمنافع مع طبيبك. الوبيريونول يمر إلى حليب الثدي. استشر طبيبك قبل أن الرضاعة الطبيعية.

وقد واجهت زيادة في عدد الهجمات ملطخ بالدم لعدة أسابيع إلى أشهر بعد بدء تشغيل هذا الدواء بينما الجسم تتخلص من زيادة حمض اليوريك. الوبيريونول ليس الأم المخلص. لتخفيف الألم، تواصل اتخاذ الخاص بك الأدوية الموصوفة للهجمات ملطخ بالدم (على سبيل المثال، كولشييسين، آيبوبروفين، الاندوميثاسين) حسب توجيهات الطبيب.

## ما هي الآثار الجانبية التي قد تلاحظ من أخذ هذا الدواء؟

الآثار الجانبية التي يجب عليك إبلاغ prescriber أو الرعاية الصحية المهنيّة أسرع:

- سهلة النزيف/كدمات
- علامات للعدوى (مثل الحمى والحلق الممتمة)
- تشغيل كمية البول
- الجلد أو العيون متلاقيّة
- ألم في المعدة شديدا/الابطن
- استمرار الغثيان/القيء/انقص الشهية
- البول الداكن
- التعب غير عادية

- فقدان الوزن غير عادية

الآثار الجانبية التي عادة لا تتطلب العناية الطبية (التقرير الخاص بك بريسكريبير أو الرعاية الصحية المهنية إذا كانت مواصلة أو مزعج):

- اضطراب في المعدة
- الغثيان
- الإسهال
- طعم غير عادية
- الهجمات ملطخ بالدم الحاد
- النعاس

هذه القائمة قد لا تصف جميع الآثار الجانبية المحتملة.

## حيث يمكنك أن تبقى دوائي؟

تبقى بعيداً عن متناول الأطفال.

تخزين المنتج في درجة حرارة الغرفة بين 59-77 درجة فهرنهايت (15-25 درجة مئوية) بعيداً عن الضوء والرطوبة. لا تخزن في الحمام. إبقاء جميع الأدوية بعيداً عن الأطفال والحوانات الأليفة.

## الكلمات

شراء Zyloprim لـ لـ وضحاها, Zyloprim للبيع, Zyloprim الصيديات على الإنترنت, شراء Zyloprim المدينة المنورة, شراء Zyloprim إمارة دبي, Zyloprim, أقراص الإنترنت الإمارات العربية المتحدة, شراء Zyloprim الإمارات العربية المتحدة, شراء Zyloprim البدائل, شراء Zyloprim الفجيرة, Zyloprim, تسليم سريع, رخصة Zyloprim على الإنترنت السعودية جزيره العرب, أمر Zyloprim الإنترنت في المملكة العربية السعودية, الرخصة Zyloprim الإمارات العربية المتحدة أون لاين, شراء Zyloprim الإنترنت في الإمارات العربية المتحدة, Zyloprim الإمارات العربية المتحدة أون لاين, شراء Zyloprim على الإنترنت بدون وصفة طبية, شراء 180 \* 100mg zyloprim في السعودية جزيره العرب, Zyloprim حبوب منع الحمل, شراء Zyloprim على الإنترنت ماستر كارد, شراء Zyloprim رأس الخيمة, شراء 100 mg Zyloprim في جزيره العرب السعودية, شراء 300 mg Zyloprim في جزيره العرب السعودية, شراء Zyloprim 300 mg في جزيره العرب السعودية, عام Zyloprim على الإنترنت, شراء zyloprim 90 \* 300mg في السعودية جزيره العرب,